

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Departamento de Ciencias Clínicas



**ESTIMACIÓN DE OBESIDAD POR DOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE
CONDICIÓN CORPORAL EN CANINOS GONADECTOMIZADOS EN LA
CLÍNICA VETERINARIA UDEC ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2009**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO
A LA FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO
DE MÉDICO VETERINARIO**

RAMIRO ALFONSO CARRASCO CÁCERES
CONCEPCIÓN – CHILE

2018

I. RESUMEN

ESTIMACIÓN DE OBESIDAD POR DOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CONDICIÓN CORPORAL EN CANINOS GONADECTOMIZADOS EN LA CLÍNICA VETERINARIA UDEC ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2009

ESTIMATION OF OBESITY FOR TWO METHODS OF CORPORAL CONDITION MEASUREMENT IN GONADECTOMIZED DOGS AT UDEC VETERINARY CLINIC FROM 2006 TO 2009

En este trabajo se evaluaron dos métodos clínicos de medición de condición corporal, para estimar el porcentaje de grasa corporal y presentación de obesidad en los caninos gonadectomizados en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Concepción, campus Concepción, entre enero de 2006 y diciembre de 2009. Se citaron pacientes caninos adultos gonadectomizados previamente en la clínica y utilizando el sistema de calificación de condición corporal junto con el análisis morfométrico desarrollado por Hawthorne (2005), se determinó que el 41% presentaron una calificación de condición corporal de categoría 8 y un promedio de porcentaje de grasa corporal de 57,9%, además se observó una relación significativa entre los dos métodos (Pearson= 0,555, p valor < 0,05), tendencias similares de presentación de obesidad en ambos sexos y un aumento de incidencia conforme aumenta la edad.

Palabras clave: condición corporal, gonadectomía, morfometría, porcentaje de grasa corporal, perro.